



## Riesgos de Salud sometidos a Vigilancia Sistemática ACTIVOS – 19 Septiembre 2014

ALERTA	LOCALIZACIÓN	CASOS SOSPECHOSOS	CASOS CONFIRMADOS	FECHA INICIO	SITUACIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES FAS
CHIKUNGUNYA	Americas	580.526	5.272	dic-13	ACTIVO	La epidemia ha alcanzado America Central al confirmarse casos en El Salvador y Costa Rica	Se recomienda la adopción de medidas de protección frente picadura de mosquito.
MERS-CoV*	Emiratos Arabes Unidos y Arabia Saudí	839	839	sep-12	ACTIVO	<a href="#">Protocolo frente Mers-CoV</a>	
GRIPE AVIAR	CHINA	450	450	abr-13	ACTIVO	<a href="#">Protocolo frente Gripe Aviar H7N9</a>	
POLIO	Cuerno de Africa y OTROS	216	216	abr-13	ACTIVO	Pakistán, Afganistan, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Somalia, Camerún, Iraq, Siria, Etiopia <a href="#">Recomendaciones temporales por OMS</a>	
EBOLA	Africa Occidental	3.093	1.757	mar-14	ACTIVO	<a href="#">Ebola rapid risk assessment</a> Guinea Conakry, Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Senegal	
EBOLA	R. D. Congo	62	14	Agosto-14	ACTIVO	Brote no relacionado con el presente en África Occidental	
DENGUE	Francia	1	1	ago-14	ACTIVO	Autóctono	



Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa "Capitán Médico Ramón y Cajal".  
Glorieta del Ejército s/n 28047 Madrid  
Teléfono: 914222349 8212349  
Mail: instit.medicina.prevent.defensa@oc.mde.es

FIEBRE AMARILLA	República Democrática del Congo	59	34	mar-14	ACTIVO	Todo el personal desplegado en la zona se encuentra vacunado frente a F. Amarilla
MALARIA	Egipto	19	19	jun-14	ACTIVO	Se recomienda la adopción de medidas de protección frente picadura de mosquito.
COLERA	Republica Dominicana, Haití, Cuba, México	734.141	–	oct-10	ACTIVO	Se recomienda el cumplimiento estricto de las normas de seguridad e higiene alimentaria.

**\*MERS-CoV – Se han notificado casos importados esporádicos en MALASIA, GRECIA, EGIPTO, IRAN, YEMEN, USA y HOLANDA.**

**\*\* La OMS ha recomendado que las personas que se desplacen a los siguientes países: AFGANISTÁN, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Iraq, Israel, Somalia, Nigeria, Pakistán, Camerún y Siria y por un periodo superior a cuatro semanas reciban una vacuna de poliomielitis entre un mes y un año antes de su llegada a estos países. Para Pakistán, Camerún y Siria esta vacunación es obligatoria, pudiendo impedirse la entrada o salida del país a quienes no acrediten haberla recibido.**